

Risico op een overstimulatiesyndroom

Adviezen



U hebt een verhoogd risico op het ontwikkelen van een overstimulatiesyndroom. (OHSS). OHSS is een mogelijke complicatie bij een vruchtbaarheidsbehandeling. Het is belangrijk een overstimulatiesyndroom tijdig te onderkennen en u eventueel extra te controleren. Wij vragen u daarom de volgende instructies op te volgen.

Adviezen

- Neem uw rust.
- Drink genoeg; minimaal 2 liter water per 24 uur.
- Neem bij pijn drie tot vier keer per dag paracetamol; per keer 2 tabletten van 500mg.
- Weeg u dagelijks.
- Meet dagelijks uw buikomtrek ter hoogte van uw navel.

Neem contact op met het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde bij

- te weinig of helemaal niet plassen;
- benauwdheid;
- een gewichtstoename van meer dan één kilo per dag;
- acute, hevige buikpijn;
- misselijkheid, overgeven en/of diarree;
- ongerustheid;
- toename van uw buikomtrek.

Bij spoed zoals hevig bloedverlies dat niet stopt, koorts, hevige buikpijn, belt u het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde en kiest u 1 voor spoed.

Buiten kantooruren wordt u automatisch doorgeschakeld met de verloskamers.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog klachten, neem dan contact met ons op.

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde - doktersassistente

043 – 387 53 60

8:30 uur - 12:00 uur

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde - verpleegkundige

043 – 387 53 60 13:30 uur – 15:30 uur

E-mail: centrumvpg@mumc.nl

Website

- centrumvpg.mumc.nl/