

# Neuszalf bij Centraal Veneuze Katheter

Gebruik van Bactroban neuszalf bij een dialyselijn

## Neuszalf

Om ontstekingen te voorkomen is het heel belangrijk dat u elke maand **Bactroban®** (mupirocine) neuszalf gebruikt. U doet dit vanaf dat u de dialyse katheter heeft gekregen totdat deze verwijderd wordt.

(Als Bactroban niet leverbaar is, krijgt u fusidine zalf voorgeschreven)



## Gebruik

De neuszalf moet elke eerste week van de maand in beide neusgaten ingebracht worden; **dus dagelijks van de 1e tot en met de 7e dag van elke maand.**

De overige 3 weken hoeft u de zalf niet te gebruiken.

## Als de neuszalf bijna op is?

U vraagt een nieuw recept tijdens de visite op de eerste dialyse van de week (dus maandag of dinsdag).

## Contact

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of dialyse verpleegkundige.

### Dialyse afdeling

T: 043-387 60 79

Maandag, woensdag en vrijdag van 06:30 uur tot 22:30 uur en dinsdag, donderdag en zaterdag van 06:30 uur tot 17:30 uur.

### Spoedeisende Hulp (SEH)

T: 043-387 67 00

's Avonds, 's nachts en in het weekend

### Polikliniek Interne Geneeskunde

T: 043-387 51 00

Werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur.

**Alarmnummer: 112**

## Website

- [mumc.nl](https://mumc.nl)
- [Homepage | Nefrologie \(mumc.nl\)](#)