

Gastroscoopie bij Barrett slokdarm

Onderzoek van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm

U krijgt een gastroscoopie.

Hieronder leest u informatie over dit onderzoek.

Het voorgesprek

De arts regelde voor u een gastroscoopie.

De arts heeft u uitgelegd hoe dit onderzoek gaat en welke problemen daarbij soms kunnen ontstaan.

De arts heeft ook gevraagd of u bloedverdunners gebruikt.

De arts vertelde u of u hiermee moet doorgaan of stoppen.

Het kan ook zijn dat u tijdelijk een andere bloedverdunner moet gebruiken.

Heeft u vragen over het onderzoek, uw medicijnen of de voorbereiding?

Vraag het aan de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.


Vorbereiding op het onderzoek

- U moet nuchter zijn:
 - Bij een onderzoek in de ochtend:
U mag niet meer eten, drinken en roken vanaf middernacht.
 - Bij een onderzoek in de middag:
U mag niet meer eten, drinken en roken vanaf 8 uur 's ochtends.
U mag vóór 8 uur nog wel een cracker of beschuitje eten.
- Medicijnen mag u wel innemen met wat water.
- Nuchter betekent niet eten, niet drinken en niet roken.

Afspraak

U krijgt van de afdeling Endoscopie een datum waarop het onderzoek gebeurt.

Als u op deze datum niet kunt, belt u dan met het nummer 043-3877700.



01 Endoschoop 02 Flexibele slang van de endoscoop
03 Slokdarm 04 Maag 05 Licht uit endoscoop

Gastroscoopie © Van der Zon - Visueel. Deze illustratie is met toestemming overgenomen van de Maag Lever Darm Stichting.

Dag van het onderzoek

U bereikt de afdeling Endoscopie in het MUMC+ via looproute **Gz groen**. U meldt zich bij onze balie tien minuten vóór het begin van het onderzoek.

Op de behandelkamer controleren wij nog een keer uw naam en geboortedatum. Daarna krijgt u een polsbandje waar dit op staat. Hierna gaat u liggen op het bed. U krijgt een infuusnaald en we sluiten u aan op de monitor.

We doen een “time out” om nóg een keer te controleren of we bij de juiste persoon het juiste onderzoek gaan doen. We vragen nog een keer naar bloedverdunners, een allergie voor medicijnen, pacemakers of implantaten in een heup of knie. Dit is ook een goed moment dat u aan ons nog dingen kunt vragen.

Hierna begint het onderzoek.

Begeleiding

Als u een begeleider meeneemt, dan wacht deze tijdens het onderzoek in de wachtkamer. De begeleider mag niet bij het onderzoek zijn.

Het onderzoek

De arts bekijkt met veel aandacht het slijmvlies aan de binnenkant van de slokdarm. Dit gebeurt via de mond met een endoscoop. Een endoscoop is een dunne, flexibele slang met aan het einde een camera en een lampje. Er zullen weefselhapjes worden afgenomen uit de slokdarm. De patholoog anatoom kijkt met de microscoop of er afwijkende, onrustige cellen zijn. Deze afwijkingen heten dysplasie.

Als u meer wilt weten over de Barrett slokdarm, verwijzen we u graag naar de folder van de Maag Lever Darm Stichting:

[Barrett slokdarm - Maag Lever Darm Stichting \(mlds.nl\)](https://www.mlds.nl).

[\(https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/barrett-slokdarm/\)](https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/barrett-slokdarm/).

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Tijdens een gastroscopie ligt u op uw linkerkant op de onderzoeksbank.

Als u een kunstgebit heeft, moet u die uitdoen. Soms krijgt u een drankje dat voorkomt dat uw maag slijm vormt tijdens het onderzoek.

De arts verdooft uw keel met een spray. Deze spray zorgt dat u minder kokhalst tijdens het onderzoek.

Een verpleegkundige plaatst een bijtring tussen uw kaken om uw gebit en de endoscoop te beschermen. De arts brengt de endoscoop door de ring in uw keel. Daarna vraagt de arts u om te slikken. Doordat u de flexibele slang zelf inslikt, komt deze makkelijk in de slokdarm. Daarna bestuurt de arts de endoscoop verder.

Als u uw medicijnen wilt/moet innemen na het onderzoek, dan moet u die van thuis meenemen. Wij hebben deze niet op voorraad.

Mogelijke complicaties

Een gastroscopie is over het algemeen een veilig onderzoek.

Heel soms kunnen de volgende complicaties gebeuren:

- De kans op problemen met ademen of met het hart wordt groter.
We controleren u hierop continu via een knijper op uw vinger of aan uw oor.
Ook controleren we elke vijf minuten uw bloeddruk.
- Als er nog voedsel in uw maag zit, kunt u dit tijdens het onderzoek 'opboeren' en u hierin verslikken.
Als het voedsel in de luchtpijp komt, is er ook een risico op een infectie van de luchtwegen.
- Door krachtig opboeren tijdens het onderzoek of door moeilijk passeren van de endoscoop, kan het slijmvlies soms beschadigen. Dit kan een kleine bloeding geven.
- Er is een kans dat u keelpijn heeft na het onderzoek. Deze pijn verdwijnt meestal na een dag.
- Als de endoscoop moeilijk de keel passeert of als de slokdarm een vernauwing heeft, kan een scheurtje of schaafwondje in de slokdarm ontstaan.

Opleiding

In het MUMC+ werken ook artsen in opleiding tot maag-darm-leverarts (MDL-arts). Het kan zijn dat een MDL-arts in opleiding het onderzoek bij u doet. In dat geval is er altijd óók een ervaren MDL-arts bij het onderzoek.

Wegnemen van stukjes weefsel (biopten) of een poliep

Bij afwijkingen van het slijmvlies kan de arts tijdens het onderzoek besluiten om stukjes weefsel weg te nemen. U voelt dit niet, maar het kan wel wat bloedverlies geven. De patholoog onderzoekt de stukjes weefsel onder de microscoop.

Wanneer de arts tijdens het onderzoek poliepen ziet, kan hij deze meestal direct verwijderen. Dat gebeurt door een lus van metaaldraad als een lasso om de poliep heen te leggen.

Door het metaaldraad gaat een elektrische stroom, waardoor de metaaldraad de poliep afsnijdt. U voelt dit niet, maar het kan wel bloedverlies geven.

De patholoog onderzoekt de poliepen onder de microscoop.

Na afloop van het onderzoek

U krijgt een kaartje mee naar huis met het nummer dat u kunt bellen als u thuis problemen krijgt. Gebruikt u normaal bloedverdunders? Dan staat op het kaartje ook een advies voor de bloedverdunders.

Uitslag van het onderzoek en verdere behandeling

Na het onderzoek krijgt u een kaartje mee naar huis waarop staat bij wie en wanneer u de uitslag en eventuele verdere behandeling krijgt.

Het kan zijn dat de huisarts het onderzoek heeft aangevraagd. Dan moet u zelf een afspraak bij de huisarts maken om de uitslag te bespreken. De huisarts krijgt binnen 14 dagen na het onderzoek bericht van ons.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, vraag het dan aan uw arts.

U kunt ook bellen met de afdeling Endoscopie van het MUMC+ op nummer 043 - 3877700.

Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur.

Of u kunt een e-mail sturen naar

endoscopie@mumc.nl

(<https://prd.corp/PrivateData/Users/htheu/Downloads/endoscopie@mumc.nl>).

Websites

- www.mumc.nl (<http://www.mumc.nl/>).
- www.mdl.mumc.nl
(<http://www.mdl.mumc.nl/>).
- [www.gezondidee.mumc.nl](http://odin.prd.corp/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e5e32601-3388-46a6-9491-75975432c17e)
(<http://odin.prd.corp/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=e5e32601-3388-46a6-9491-75975432c17e>).
- [Barrett slokdarm - Maag Lever Darm Stichting \(mlds.nl\)](http://www.mlds.nl)
(<https://www.mlds.nl/chronische-ziekten/barrett-slokdarm/>).