

Het gebruik van imiquimod crème

Behandeling van een CIN2 of CIN3 afwijking


U heeft een CIN 2 of CIN 3 afwijking en koos voor de behandeling hiervan met imiquimod crème. In deze folder leest u hoeveel weken u de crème gebruikt, hoe u de crème gebruikt, wat u doet bij bijwerkingen en wanneer u controles krijgt.

Hoe gebruikt u de crème?

De behandeling met de crème duurt 16 weken.
U gebruikt de crème 2 of 3 keer per week.

Hoe gebruikt u de crème?

- Spuit de crème in de vagina met een applicator. Dat is een spuitje die u zelf vult met de crème.
- Gebruik de crème in de avond voor het slapen. U mag daarna geen seks hebben.
- In de ochtend spoelt u de restjes crème weg met de douche.
- Gebruik de dag na het inbrengen van de crème een tampon. Wissel de tampon iedere 4 tot 6 uur. Door de tampon kan de crème niet uit de vagina. Hiermee voorkomt u irritatie van de schaamlippen.



Het inbrengen van de imiquimod crème

Het schema van de behandeling en de controles

Het schema van de behandeling is:

1. 16 weken imiquimod crème
2. 2 weken na start met imiquimod crème volgt er een belafsprak met de verpleegkundig specialist om te bespreken hoe het gaat

Hieronder vindt u een overzicht van de eerste 6 maanden na het starten met de imiquimod crème.

Imiquimod-behandeling

Week 0	Start behandeling met imiquimod-crème
Week 2	Telefonische afspraak: bespreken van eventuele bijwerkingen
Week 16	Stop imiquimod-crème
Maand 6	Uitstrijkje ter controle

Wat doet u bij bijwerkingen?

Welke bijwerkingen zijn mogelijk?

Uit onderzoeken naar imiquimod crème zijn weinig ernstige bijwerkingen bekend.

De meest voorkomende bijwerking is *vaginale afscheiding* en soms ook een beetje *pijn of jeuk in de vagina*.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn *spier-pijn en stijve spieren, moe zijn, hoofdpijn* en een *koortsig gevoel*.

Wat kunt u doen bij bijwerkingen?

Krijgt u klachten van *spier-pijn en stijve spieren, moe zijn, hoofdpijn* of een *koortsig gevoel*?

Doet u dan het volgende:

1. Gebruik pijnstillers op de dagen dat u klachten heeft:
 - 4 keer per dag 1000 milligram paracetamol.
Dat is hetzelfde als 4 keer per dag 2 tabletten van 500 milligram.
 - Zo nodig kunt u daarbij ook 3 keer per dag 400 milligram ibuprofen slikken.
2. Als dat onvoldoende helpt, bel dan met onze verpleegkundig specialist.
Haar naam en telefoonnummer staan hieronder.
Zij zal u adviseren om de dosis van de imiquimod te verlagen of tijdelijk te stoppen.

Belangrijk om te weten

U mag tijdens de behandeling met imiquimod **niet zwanger worden**.

U moet daarom anticonceptie gebruiken tijdens de hele periode van de behandeling.

Gebruikt u nog géén anticonceptie? Dan kan uw gynaecoloog u adviseren over de mogelijkheden.

Imiquimod maakt een condoom minder sterk.

Het gebruik van alleen een condoom is daarom niet genoeg om een zwangerschap te voorkomen.

Gebruik geen nuva-ring als anticonceptie tijdens de behandeling. Want het is niet bekend of de nuva-ring goed werkt tijdens het gebruik van imiquimod in de vagina.

Het gebruik van imiquimod bij CIN afwijkingen is een 'off-label indicatie'.

Dat betekent dat de crème in eerste instantie niet is ontwikkeld voor CIN afwijkingen.

Intussen weten we uit wetenschappelijk onderzoek dat de crème óók geschikt is voor de behandeling van CIN afwijkingen.



Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen? Belt u dan met de verpleegkundig specialist.

Naam:

Charlotte Penders, verpleegkundig specialist

Als zij er niet is: Moniek Kamps

Telefoonnummer tijdens kantooruren:

043 - 387 65 43

Vraag naar sein 5536 / 043 - 38 742 41

Telefoonnummer in de avond en in het weekend:

043 - 387 62 40 (afdeling verloskunde)

Websites

- www.mumc.nl (<https://www.mumc.nl/>).
- [www.oncologie.mumc.nl](https://oncologie.mumc.nl/) (<https://oncologie.mumc.nl/>).