

Endo-sponge® plaatsen/wisselen

Bij een slechte genezing na (gedeeltelijke) verwijdering van uw endeldarm

Uw endeldarm is gedeeltelijk of helemaal verwijderd. Helaas is er vervolgens een complicatie opgetreden, waardoor een holte is ontstaan die niet goed wil genezen. Dit komt doordat deze holte niet goed schoongespoeld kan worden. Om dit te verhelpen wordt u behandeld met een Endo-Sponge® oftewel een spons in deze (darm) holte.

De behandeling vindt plaats op de afdeling Endoscopie van het Maastricht UMC+.

“ Het is verplicht dat u een begeleider meeneemt naar het onderzoek. Uw begeleider is bij het gesprek met de arts na het onderzoek. Ook brengt hij of zij u naar huis. U mag de rest van de dag niet zelf fietsen of auto rijden

Hoe werkt een Endo-Sponge®?

Een Endo-Sponge® wordt in de holte ingebracht via uw anus en is met een slangetje verbonden aan een vacuümpot (Redyrob®). Het vuil uit de darmholte komt via het slangetje terecht in de vacuümpot, die u bij u draagt. Op deze manier wordt de holte schoongehouden, wat het herstel bevordert. De spons wordt twee keer per week vervangen. Geleidelijk wordt de holte steeds kleiner, tot deze uiteindelijk dichtgroeit.

Vorbereiding

Bij de afdeling Endoscopie krijgt u een infuus ingebracht, omdat u een roesje krijgt. U mag dan zelf niet meer deelnemen aan het verkeer.

Breng extra ondergoed en/of stomamateriaal mee.



1 Anastomose



2 De naadlekage met lokale infectie in het kleine bekken



3 Diagnose stellen via flexibele endoscoop



4 De EndoSponge kan op maat worden geknipt



5 Polyurethane spons



6 De tube gaat over de endoscoop en wordt in de holte gebracht



7 De EndoSponge wordt d.m.v. de pusher door de tube in de holte geplaatst



8 De tube wordt verwijderd. De EndoSponge zit op zijn plaats



9 Afhankelijk van de grootte van de holte kunnen er 1 tot 3 sponzen in een holte worden geplaatst



10 Bevestig de Redyrob Trans Plus aan de drain. Verwijder het rode dopje



11 De open poriën van de spons bevorderen een gelijkmatige afzuiging van afscheiding en granulatie. Zodoende krijg je een geleidelijke verkleining van de holte



12 Het genezen van de holte. De Endosponge moet elke 48-72 uur worden vervangen

De behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw linkerkzijde. De behandeling wordt over het algemeen niet als plezierig ervaren en kan pijnlijk zijn, daarom dient de arts u via het infuus een roesje toe, waardoor de behandeling minder belastend is. Het roesje bestaat uit een pijnstiller en/of een ontspanningsmiddel. Het medicijn maakt u wat slaperig en vermindert uw reactievermogen.

Als u komt om een Endo-Sponge® te vervangen, krijgt u een verdovende vloeistof ingespoten in de huidige spons. Hierdoor gaat het verwijderen makkelijker.

De arts verwijdert de spons die al in de holte zit. Vervolgens wordt er een dunne camera via de anus naar binnen gebracht. Dit kan een drukkend gevoel of kramp veroorzaken, omdat er lucht in de darm geblazen wordt.

De arts beoordeeld de holte en plaatst indien nodig direct een nieuwe spons. Het vacuüm in het wondgebied veroorzaakt soms een pijnlijk gevoel dat na enkele minuten afzwakt. De slang wordt vastgeplakt op uw been of bil, zodat u mobiel bent en zich veilig kunt bewegen. Het wisselen van de Endo-Sponge® duurt gemiddeld 20 minuten.

De behandeling wordt in principe twee keer per week herhaald. De behandeling met de Endo-Sponge® varieert van een paar weken tot een paar maanden. Dit hangt af van de omvang van de holte en het tempo van het genezingsproces.

Na de behandeling

Een opgeblazen gevoel na de behandeling is heel normaal, winden laten helpt hierbij. Na het onderzoek bespreekt de arts zijn bevindingen met u en uw begeleiding en krijgt u een nieuwe afspraak voor de volgende Endo-Sponge® wissel.

Mogelijke complicaties

Als u na de behandeling hevige buikpijn krijgt, of koorts boven de 38 graden, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Verzorging thuis

De uitleg krijgt u op de endoscopieafdeling en u kunt als dat nodig is contact met ons opnemen!

U kunt de vacuümpot (redyrob®) thuis wisselen als deze vol is, of als pot niet meer vacuüm is (dit ziet u als de blauwe markering van de pot helemaal tot onderen is gedaald).

1. Verschuif het klemmetje op de slang.
2. De slang zit nu dicht.
3. Draai de draaiknop naar o.
4. Draai de verbinding tussen de slang en de pot los.
5. Bewaar de pot om deze mee te nemen bij de volgende behandeling.
6. Haal het rode dopje van de Redyrob®.
7. Sluit de Redyrob® aan op de slang.
8. Zet de draaiknop op stand 1.
9. Schuif het klemmetje van de slang los zodat de slang open is, nu zal de vloeistof langzaam gaan lopen.
10. Plak de slang vast op bil of been, zodat u mobiel bent en veilig kunt bewegen.

Contact

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, vraag het dan aan uw arts.

U kunt ook bellen met de afdeling Endoscopie van het MUMC+ op nummer 043 - 3877700. Dat kan op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur. Of u kunt een e-mail sturen naar endoscopie@mumc.nl.

Websites

- www.mumc.nl
- www.mdl.mumc.nl
- www.gezondidee.mumc.nl
- www.bbraun.nl

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2022