




Behandeling met denosumab (Prolia)

Bij osteoporose



In overleg met uw arts start u een behandeling met Prolia. Dit is een medicijn tegen botontkalking. Een ander woord voor botontkalking is osteoporose.

In deze folder leest u hoe dit medicijn werkt. Ook leest u hoe we u dit medicijn geven. En welke bijwerkingen dit medicijn soms heeft.

Hoe werkt Prolia?

Dit medicijn zorgt ervoor dat uw botten niet nog slechter worden.

Het maakt uw botten ook weer sterker.

Hierdoor is de kans kleiner dat u opnieuw uw botten breekt. Ook wordt de kans kleiner dat uw wervels inzakken.

In het medicijn Prolia zit de stof denosumab.

Denosumab remt de cellen die zorgen voor afbraak van het bot. Hierdoor breekt minder bot af.

Hoe krijgt u Prolia?

Wij geven u spuiten met Prolia. Deze spuiten zetten wij in uw buik of dij.

U krijgt 3 jaar lang elke 6 maanden een spuit met Prolia.

Soms heeft u de spuiten langer nodig. U krijgt deze spuiten maximaal 10 jaar.

Het is belangrijk dat u de spuiten precies om de 6 maanden krijgt.

Stop nooit zomaar met de spuiten. Bespreek dit altijd eerst met uw arts.

Want stopt u met de spuiten? Of wacht u langer dan 6 maanden met de spuiten? Dan breken uw botten misschien sneller af. Daardoor zakken misschien meer wervels in.

Mogelijke bijwerkingen

- Pijn in spieren en botten
- Zenuwpijn in de bil of het been
- Buikklachten, verstopping van de darmen
- Ontstekingen: van de nieren, urineleiders, blaas, plasbuis, neus, keel, bijholten of van de huid

Bent u overgevoelig voor denosumab? Dan krijgt u misschien een allergische reactie. U krijgt dan veranderingen van de huid, koorts of u bent benauwd.

Heeft u hier last van? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts.

Zeer zeldzame bijwerkingen

Heeft u nieuwe of vreemde pijn in uw heup, lies of dijbeen? Neem dan contact op met uw specialist of osteoporose-verpleegkundige.

Heel soms ontstaan problemen met het bot van de onderkaak. Uw onderkaak wordt dan dikker, ontsteekt en breekt. U heeft dan ook pijn.

De kans hierop is groter bij:

- Het slecht schoon houden van de mond en tanden
- Operaties aan de mond en kaak
- Losse kiezen of tanden
- Roken
- Het plaatsen van kunsttanden

Heeft u vragen over deze zeldzaam voorkomende bijwerkingen? Bespreek dit dan met uw specialist of osteoporose-verpleegkundige.

Een schone mond is belangrijk

- Vertel uw tandarts dat u Prolia gebruikt.
- Laat uw gebit elke 6 maanden controleren.
- Houd uw mond en tanden goed schoon. Poets en flos uw tanden.
- Gaat uw tandarts of kaakchirurg kiezen trekken of kunsttanden plaatsen? Dan overlegt hij misschien eerst met uw arts.

Controle

Na 3 jaar behandeling krijgt u weer een DEXA-scan. Zo meet de arts het gevolg van de behandeling.

U krijgt weer een DEXA-scan in

Contact

Heeft u nog vragen? Of heeft u bijwerkingen?
Neem dan contact op met:

Brugpoli 043-387 56 69

Polikliniek Interne Geneeskunde 043-387 51 00

Websites

- [MUMC+](https://www.mumc.nl) (<https://www.mumc.nl>).
- [Osteoporosevereniging](https://www.osteoporosevereniging.nl) (<https://www.osteoporosevereniging.nl>).
- [Reumanederland](https://reumanederland.nl) (<https://reumanederland.nl>).